

تخدير موضعي لعلاج كسر مضاعف



«القاهرة:» الخليج

نجحت طريقة التخدير الموضعي، في إجراء عملية جراحية استمرت خمس ساعات، لإصلاح كسر مضاعف بعظمة العضد لسيدة تعاني من تليف رئوي في مصر.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المريضة حضرت إلى أحد مستشفيات الأقصر، وكانت تعاني كسراً بالعضد الأيسر.

وبعد إجراء الأشعة اللازمة، تبين أن الكسر مضاعف بعظمة العضد الأيسر، ما تطلب إجراء جراحة لتثبيت الكسر، باستخدام التخدير الموضعي الطرفي بإرشاد السونار؛ لأن المريضة تعاني من تليف بالرئة، ولا يصلح معها التخدير الكلي الذي يستخدم في عمليات تثبيت الكسور، لأنه يمثل خطراً كبيراً على حياتها.

وتمكن فريق التخدير وعلاج الألم بالمستشفى من تخدير المريضة باستخدام التخدير الموضعي الطرفي بإرشاد السونار،

لمدة 5 ساعات، وهي إحدى التقنيات التي تساعد في تخدير الأطراف العلوية، وتقليل الألم بها لفترة تتجاوز 15 ساعة، مع الإبقاء على وعي المريض، ما ساعد أطباء جراحة العظام في تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير، وعلى الرغم من صعوبة حالتها، إلا أنها لم تحتج للعناية المركزة، وتمت متابعتها بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها.

"حقوق النشر محفوظة لصحيفة الخليج. © 2024."