

## علاج جديد لسرطان الغدد الليمفاوية



### إعداد: مصطفى الزعبي

على الموافقة العاجلة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية «Epkinly» حصل عقار

الخلايا الكبيرة المنتشرة B- ومنحت الدواء الأمريكية موافقة سريعة على العقار من أجل علاج سرطان الغدد الليمفاوية أو المقاومة للحرارة، بما في ذلك الخلايا الناشئة عن ورم الغدد الليمفاوية البطيئة، وورم الغدد الليمفاوية المتفشي من الخلايا B.

ويعطى العقار حقناً لمدة 28 يوماً بجرعة 0.6 مجم في اليوم الأول، و0.8 مجم في اليوم 8، و48 مجم في اليوم 15 حتى اليوم 22، تليها جرعات ثابتة من 48 مجم

وأستندت الموافقة على بيانات التجربة من 148 مريضاً بلغ معدل الاستجابة الإجمالي، الذي تم تقييمه من قبل لجنة مراجعة مستقلة، 61%، وحقق 38% من المرضى استجابات كاملة. خلال متابعة متوسطها 9.8 شهر بين المستجيبين

تحتوي معلومات وصف الدواء على تحذير من التعب، وآلام العضلات والعظام، وتفاعلات موقع الحقن، والحمى والغثيان.

"حقوق النشر محفوظة لصحيفة الخليج. © 2024."