

دراسة صينية: تناول المهدئات يزيد من مخاطر كسور العظام



كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة هونغ كونغ عن وجود علاقة بين تناول المهدئات وزيادة مخاطر الإصابة بكسور العظام.

وأجرى الباحثون في مركز الممارسات والأبحاث الدوائية الآمنة التابع لقسم علم الأدوية والصيدلة في كلية الطب بجامعة هونغ كونغ، دراسة تبحث في العلاقة بين المهدئات والمنومات الموصوفة طبياً ومخاطرها على أكثر من 6 ملايين شخص أصيبوا بكسور العظام في 11 دولة.

وكشفت نتائج الدراسة، أن استخدام بعض الأدوية المهدئة والمنومة كان مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام، بنسبة تتراوح من 30% إلى 40% لدى الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث.

وأوصى الباحثون بأهمية التقييم الدقيق لفوائد ومخاطر المهدئات والمنومات قبل وصفها للمرضى، خاصة لدى Sleep Medicine Reviews الأشخاص الذين يعانون ارتفاع خطر الإصابة بكسور العظام، بحسب مجلة وربطت الدراسة بين تناول المهدئات والمنومات وزيادة خطر سقوط المرضى، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين لديهم خطر أعلى للإصابة بالكسور، مثل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 85 عاماً أو أكثر أو الذين يعيشون بمفردهم، يجب وصف هذه الأدوية لهم بحذر.

ونصح الباحثون بضرورة تقديم الاستشارة الطبية المناسبة للمرضى قبل وصف المهدئات والمنومات، ومراقبة مخاطر السقوط والعمل على تفاديها أو التقليل منها واتخاذ التدابير اللازمة

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024