

أنواع لقاحات أساسية للأطفال بعمر 4 و6 أشهر





ALHOSN

أبوظبي: عماد الدين خليل

حدد تطبيق «الحصن» 6 أنواع من اللقاحات الأساسية المطلوبة والمهمة للأطفال بعمر 4 أشهر و6 أشهر، لحمايتهم من الأمراض.

وكشف التطبيق عن 3 لقاحات تتضمن «لقاح روتا 2» ويعطى وفق جدول معتمد الجرعات، حيث تعطى الجرعة الثانية عند عمر 4 أشهر، لضمان حصول الرضع على الحماية المثلى ضد فيروس الروتا.

أما اللقاح الثاني فهو «هيكسا 2» اللقاح السداسي، ويعطى بجرعات متعددة لتوفير الحماية الشاملة ضد الدفتيريا من المستديمة النزلية الهيموفيلية، والجرعة B والنوع B والسعال الديكي والتيتانوس، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الثانية التي تعطى في عمر 4 أشهر لتقوية المناعة لدى الأطفال وتمديدها.

ويعطى عند 4 أشهر لتوفير حماية معززة ومستمرة ضد الأمراض التي PCV2 «واللقاح الثالث» لقاح المكورات الرئوية تسببها بكتيريا العقدة الرئوية ويمنع الأمراض الخطرة المرتبطة بالالتهاب الرئوي.

ويبين التطبيق أن الجرعات اللقاحية المطلوبة للطفل من عمر 6 أشهر تتضمن أيضاً 3 أنواع وتشمل لقاح «بي سي في 3» ويعطى لتوفير حماية مستدامة ضد الأمراض التي تسببها البكتيريا العقدية الرئوية، والوقاية من الأمراض الشديدة المرتبطة بالالتهاب الرئوي، ولقاح «بي أو بي في 1» وهو الجرعة الأولى من سلسلة لقاحات شلل الأطفال، لتعزيز المناعة ضد شلل الأطفال وتضمن الجرعات اللاحقة في السلسلة الحماية المستمرة ضد شلل الأطفال.

أما اللقاح الثالث فهو «اللقاح الخماسي بنتا 1»، وهو الجرعة الأولى في سلسلة من اللقاحات الخماسية، وتشمل عادة B. والتهاب الكبد الوبائي B الحماية ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي والمستديمة النزلية من النوع